

Salazopyrin

Hvad er Salazopyrin?

Salazopyrin anvendes ved kronisk leddegigt og er et såkaldt langsomt virkende gigtmiddel. Salazopyrin kaldes også Sulfasalazin.

Til hvilke sygdomme bruges Salazopyrin?

Salazopyrin anvendes typisk til behandling af leddegigt, Morbus Bechterew, psoriasisgigt og andre gigt- og bindevævs-sygdomme.

Hvordan virker Salazopyrin?

Salazopyrin helbreder ikke din sygdom, men bremser sygdommens udvikling ved at hæmme en række forskellige celler og signalstoffer i immunsystemet.

Virkningen viser sig ved at hævelse, ømhed og stivhed i dine led aftager. Forandringer i leddene på grund af sygdommen ændrer sig ikke. Men udvikling af flere forandringer kan begrænses ved behandling med Salazopyrin.

Salazopyrin virker som regel først efter 4-12 ugers behandling. Virkning ses kun hos 2/3 af dem, der starter på behandlingen.

Vi kan ikke på forhånd afgøre, hvem der vil have gavn af Salazopyrin. Hvis Salazopyrin har den ønskede effekt, må du regne med at være i behandling flere år frem.

Hvis du ikke har mærket nogen effekt efter 4 måneder, vil vi ofte erstatte eller supplere behandlingen med anden gigtmedicin.

Hvordan skal du tage Salazopyrin?

Salazopyrin findes som Entabs (langsomt opløselige tabletter) á 500 mg. Dosis er sædvanligvis 4 tabletter dagligt. Tabletterne skal sluges hele, og gerne i forbindelse med et måltid. Behandlingen starter med en lav dosis, der over de følgende uger stiger til den fulde dosis på følgende måde:

- 1. uge: 1 tbl. aften
- 2. uge: 1 tbl. morgen og 1 tbl. aften
- 3. uge: 1 tbl. morgen og 2 tbl. aften
- 4. uge: 2 tbl. morgen og 2 tbl. aften

Dosis kan stige til højst 6 tabletter dagligt eller sænkes, hvis du kan klare dig med mindre dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du ikke tage dobbeltdosis næste gang, men blot følge den sædvanlige ordination.

Har du fået det bedre ved hjælp af Salazopyrin og du så stopper med at tage det, er der øget risiko for at sygdommen blusser op igen.

Advarsel

Du må ikke tage Salazopyrin, hvis du er overfølsom overfor acetylsalicylsyre og sulfapræparater.

Bivirkninger

De fleste tåler Salazopyrin uden bivirkninger. Dog kan der især i starten af behandlingen komme nogle bivirkninger. De hyppigste bivirkninger er appetitløshed, kvalme og diarre. Desuden kan hovedpine også forekomme i starten.

Hos mænd kan ses en forbigående nedsat sædproduktion i behandlingsperioden.

Urinen kan blive stærk gul. Den stærke gule farve dannes i forbindelse med nedbrydningen af medicinen, og er ganske ufarlig.

Farvning af kontaktlinser (stærk gul) kan forekomme af samme årsag.

Overfølsomhed ses hos 10-15 %, og ofte først 3-4 uger efter behandling er begyndt. Overfølsomhed viser sig ved feber eller kløende udslæt især på arme, ben og krop.

Ved mistanke om overfølsomhed skal du kontakte os.

Nedsat produktion af blodplader og hvide blodlegemer ses i sjældne tilfælde. Dette kan bl.a. medføre små blødninger i hud og slimhinder, som kan vise sig ved små røde eller blå pletter på huden, næseblod eller blødning fra tandkødet. I så fald skal du kontakte os. Det samme gælder ved feber eller anden tegn på infektion.

Salazopyrin og anden medicin

Smertestillende medicin som Pinex, Pamol og Panodil, samt smertestillende gigtmicin som Ibuprofen, Diclon og Todolac, som er ordineret af lægen, kan du tage sammen med Salazopyrin.

Salazopyrin kan medføre nedsat virkning af hjertemedicinen Digoxin. Får du Digoxin skal dosis eventuelt sættes op, når du er i behandling med Salazopyrin. Digoxin dosis skal du aftale og evt. regulere sammen med din egen læge.

Der er ingen problemer ved brug af P-piller sammen med Salazopyrin.

Alkohol

Der er ingen særlige forholdsregler.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning

Under behandling med Salazopyrin danner mænd færre sædceller end normalt, men sædcellerne er i øvrigt normale. Denne påvirkning forsvinder igen, når behandlingen ophører.

Salazopyrin kan anvendes under graviditet og amning. Ved for tidlig fødsel eller gulsot hos det nyfødte barn, vurderer lægen om du skal holde pause med Salazopyrin imens du ammer.

Opfølgning på behandlingen og kontrol af blodprøver

Det er nødvendigt, at du regelmæssigt får taget blodprøver for at holde øje med eventuelle bivirkninger af Salazopyrin.

Leveren kan blive påvirket, også uden at du har nogle symptomer på dette.

Det vil kunne ses i dine blodprøver.

I starten af behandlingen er det nødvendigt med hyppige tjek af blodprøver – hver 14. dag i de første 3 måneder - indtil den rigtige dosis er fundet, og for at sikre at du tåler medicinen. Herefter er det nødvendigt med blodprøver hver 6.- 12. uge.

Ved blodprøverne kontrollerer vi bl.a. antallet af blodplader og hvide blodlegemer samt funktionen af din lever og nyrer.