Skema til aftrapning

Oxycodon

- Oxycodon er stærk smertestillende medicin og du bør trappe ud af det over nogle dage, for at undgå ubehag, når du stopper med det
- Du vurderer selv, hvornår du vil starte nedtrapning *
- Skemaet er lavet som forslag til, hvordan du kan trappe ud af Oxycodon
- Da Oxycodon kan give forstoppelse i maven, skal du forvente at have behov for afføringsmedicin, så længe du tager Oxycodon

Pt label

Tbl Oxycodon aftrappes med mg hv. 2 dag.

Dato*	Præperat:	Kl:	Kl:	Bemærkninger
	Tbl Oxycodon á mg	Tbl	Tbl	
	Tbl Oxycodon á mg	Tbl	Tbl	
	Tbl Oxycodon á mg	Tbl	Tbl	
	Tbl Oxycodon á mg	Tbl	Tbl	
	Tbl Oxycodon á mg	Tbl	Tbl	
	Tbl Oxycodon á mg	Tbl	Tbl	
	Tbl Oxycodon á mg	Tbl	Tbl	
	Ordineret af:			

Aleris Hospitaler © 7. udgave marts 2021. Udarbejdet af AMC/BMI. Revideres marts 2024. Godkendt af kvalitetsledelsen