



DC-konvertering Stød af hjertet

Når hjertet slår uregelmæssigt, kalder vi det atrieflimren, atrieflagren eller forkammerflimner. Der er kommet en forstyrrelse i de elektriske impulser, som driver hjertet.

Det kan vi behandle med medicin og med elektrisk stød af hjertet (DC-konvertering).

Ved DC-konvertering nulstilles de abnorme elektriske impulser og hjertet genvinder sin normale elektriske aktivitet.

Formål med behandlingen

Formålet med DC-konvertering er derfor at få hjertet til at slå regelmæssigt igen.

Forventninger

I de fleste tilfælde (ca. 90%) lykkes det at vende hjerterytmen til normal rytme.

Hvis du har haft flimren i flere år, kan hjertet have tilpasset sig rytme-forstyrrelsen og det kan være mere vanskeligt, at få rytmen tilbage til normal igen. Det kan evt. være nødvendigt at gentage DC-konvertering.

Forløbet på hospitalet varer i alt 2-4 timer. Du må ikke selv køre hjem.

Forberedelse

Vi anbefaler, at du inden behandlingen har læst denne folder.

Medicin

Er du i behandling med blodfortyndende medicin som fx Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis, er det vigtigt, at du har taget det regelmæssigt de sidste 4 uger.

Er du i behandling med Marevan skal INR (blodets evne til at størkne) være målt en gang ugentligt og have ligget stabilt mellem 2 - 3,5 de sidste 4 uger.

Dette er af hensyn til at minimere risikoen for blodpropper.

Anden medicin må du tage som vanlig om morgenen på dagen.

Faste

Du skal møde fastende til behandlingen. Se nærmere om fasteregler i folderen "Generel vejledning i forbindelse med operation".

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår på sengeafdelingen eller i opvågningsafsnittet. Der vil være en anæstesi-læge til stede ud over hjertelægen.

Du får sat 2-4 elektroder på ryggen og brystkassen.

Du får lagt en venflon (lille plastrør) i en blodåre på håndryggen og derigennem får du bedøvelsen. Mens du er bedøvet foretager vi DC-konverteringen via elektroderne og efter 3-5 minutter vågner du igen og behandlingen er overstået.

Efter behandlingen

Efter behandlingen bliver du observeret i et par timer. Du må få noget at spise og drikke, så snart du er vågen.

Du får taget et hjertekardiogram (EKG).

Hjertelægen taler med dig om resultatet og plan for videre behandling og opfølgning inden du tager hjem.

Mulige bivirkninger og komplikationer

Risikoen for komplikationer ved DC-konvertering er minimal (1/10.000) og behandlingen er forbundet med få bivirkninger. Det hyppigste er en mild forbrænding på huden efter elektroderne.

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket

BFFA00