



Rift ved endetarmsåbningen

Behandling med Rectogesic®

Rectogesic salve 0,4 %

Glyceryltrinitrat har været anvendt som lægemiddel i mere end 100 år til behandling af brystmerter.

Glyceryltrinitrat afslapper den glatte muskulatur i blodkarrene, således at karrene udvides, og blodgennemstrømningen øges. Ved smerter i hjertet som følge af iltmangel i hjertemuskulaturen (angina pectoris) bevirker glyceryltrinitrat således, at hjertet får mere blod og derved mere ilt.

Glyceryltrinitrat har den samme afslappende virkning på andre typer glat muskulatur.

Endetarmsmusklen består af en indre muskel, der består af glat muskulatur og en ydre, der består af muskulatur, som mere ligner almindelige muskler.

Gennem de sidste 10 år har man anvendt glyceryltrinitrat salve til patienter med rift i endetarmen (anal fissur). Glyceryltrinitrats afslappende effekt bevirker, at de kramper og smerter i lukkemusklen, som er forårsaget af riften, forsvinder samtidig med at riften heler op.

Bivirkninger

Glyceryltrinitrat optages hurtigt gennem slimhinder og hud. Får du for stor en dosis kan udvidelsen af blodkarrene i hovedet give varmefølelse, rødme i ansigtet og hovedpine. Det er derfor vigtigt, at du overholder doseringen på 2 gange dagligt.

Graviditet

Kan anvendes.

Behandling

En fingerspids 0,4 % Glyceryltrinitrat salve smøres ind i endetarmsåbningen (højst 1 cm op) morgen og aften. Såfremt der opstår hovedpine nedsættes dosis pr gang. Det er vigtigt at behandle uden pause i mindst 4 uger, også selvom smerterne skulle forsvinde tidligere. Effekten af salven kommer oftest først efter 3 - 4 uger.

Med denne behandling kan op til 70 % af personer med rift i endetarmsåbningen helbredes.

Det er vigtigt, at du undgår forstoppelse, da det er den væsentligste årsag til rifter i endetarmsåbningen.

Egne notater

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

| | Vest | Øst |
|------------------|--------|--------|
| Mandag - torsdag | 8 - 18 | 8 - 18 |
| Fredag | 8 - 15 | 8 - 16 |
| Lørdag - søndag | Lukket | Lukket |