



Rift ved endetarmsåbningen

Behandling med botox

Botulinum toxin (Botox)

Botox er et giftstof (toxin), som dannes af bakterien Clostridium Botulinum. Den kan ved dårlig fødevarerhygiejne forekomme i konserves, saltede eller røgede fødevarer. Hvis man indtager fødevarer, der indeholder Botulinum Toxin, opstår tilstanden botulisme også kaldet pøseforgiftning.

Toxinets virkning på kroppen er en hæmning af nervetransmissionen til musklerne, så der opstår lammelser. Dette bevirker, at der opstår lammelse af muskulaturen i ansigt, arme og ben, og i værste fald vejrtrækningen. Ved en forgiftning behandles symptomerne.

P.g.a. sin hæmmende effekt, er Botox dog i andre sammenhænge yderst anvendeligt. Siden 1977 har man behandlet forskellige former for muskelskramper med Botox, først visse øjensygdomme, men efterhånden også mange andre tilstande med lokaliserede muskelskramper eller andre former for overaktivitet i muskulaturen.

Inden for de seneste 10 år har Botox også vist sig effektiv ved behandlingen af visse sygdomme i mave-tarmkanalen inkl. smerter i endetarmsåbningen og rift i endetarmsåbningen.

Behandling

Indsprøjtning af Botox i lukkemusklen sker oftest i helbedøvelse. Indsprøjtningen sker 4 steder i endetarmens lukkemuskel. Placeringen af Botox i lukkemusklen sikres ved at foretage indsprøjtningerne under samtidig ultralydsskanning af lukkemusklen.

Bivirkninger

Træthed, influenzalignende symptomer og smerter ved indsprøjtningstederne kan forekomme.

Graviditet og amning

Erfaring savnes. Bør så vidt muligt ikke anvendes.

Forventet resultat af behandlingen

Ved rift i endetarmsåbningen kan 70 - 80 % forventes at have effekt af behandlingen. Ved smerter i endetarmsåbningen uden rift ses god effekt hos halvdelen af patienterne.

Virkingen af Botox varer maksimalt 3 måneder. Dette er imidlertid oftest tilstrækkeligt til at sikre en permanent effekt af behandlingen. I de tilfælde, hvor det ikke er tilstrækkeligt, kan behandlingen gentages.

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

KJHW 96