



Vanlig medicin

I forbindelse med din operation

Hvordan skal du forholde dig til den medicin, du tager til daglig, når du skal opereres?

Mange holder for lange pauser med deres nødvendige medicin op til en operation. Det kan skyldes, at det kan være svært at finde rundt i de informationer, man får. Ligeledes tager nogle mennesker mange forskellige slags medicin. Det kan imidlertid være direkte farligt at stoppe med nogle typer medicin.

Det er derfor meget vigtigt, at du læser denne folder grundigt. Ligeledes er det vigtigt, at du noterer lægens anvisninger om din vanlige medicin, når du er til samtale inden en operation.

Når du møder op til operation, skal du medbringe al din medicin i original emballage. Doseringsæske er ikke tilstrækkeligt. Årsagen er, at lægen skal kunne se præcis, hvad du tager hjemme. Endvidere har hospitalet ikke nødvendigvis al den medicin, du er vant til at få.

Du behøver ikke at tage vitaminpiller og andre kosttilskud med.

Hvad skal du holde pause med inden din operation

Blodfortyndende medicin

Tager du blodfortyndende medicin til forebyggelse af blodpropper, skal du være særligt opmærksom på lægens anvisninger om pause inden operationen.

Pausens varighed afhænger af din sygdom, hvilken medicin du tager, og hvilken operation du skal have foretaget.

Du må ikke holde længere pause end anvist, da det kan være farligt.

Nogle typer kosttilskud og naturmedicin kan virke blodfortyndende, og lægen kan bede dig holde pause med disse.

Lægen vil evt. udlevere et kort med information til dig. Er du i tvivl, skal du altid kontakte os i god tid inden operationen.

Smertestillende gigtmedicin

Smertestillende gigtmedicin kan give øget blødning ved nogle typer operationer. Lægen kan derfor bede dig holde pause med disse tabletter. Spørg, hvis du er i tvivl.

Gigtmedicin kan være tabletter, der indeholder eksempelvis:

- Ibuprofen
- Acetylsalicylsyre

Sukkersyge medicin

Det er vigtigt at blodsukkeret ikke svinger for meget, når du skal opereres.

Hvis du tager insulin om morgenen, er det vigtigt, at du er opmærksom på dit mødetidspunkt, da det har betydning for, om du skal tage medicinen. Medbring din egen sukkersygemedicin.

Mødetid til operation kl. 11.00 eller før:

Du må ikke tage insulin eller sukkersygetabletter om morgenen på operationsdagen.

Mødetid til operation efter kl. 11.00:

Du må spise et måltid inden kl. 5. Hvis du får tabletter mod sukkersyge, skal du tage dem til dit måltid. Hvis du får insulin, skal du tage halv dosis sammen med morgenmaden.

Hvad skal du fortsætte med inden din operation

Medicin for hjerte, kredsløb og lunger

Husk at holde pause med blodfortyndende medicin, som anvist af lægen. Din øvrige blodtryksmedicin og medicin for hjertet skal du fortsætte med, helt som du plejer. Det gælder også, hvis du tager lungemedicin.

Medicin for nervesystemet

Du skal fortsætte din medicin, helt som du plejer, hvis du er i behandling for eksempelvis psykisk lidelse, epilepsi, Parkinsons sygdom eller andre sygdomme i nervesystemet.

Smertestillende medicin

Som skrevet ovenfor, kan du blive bedt om at holde nogle dages pause med smertestillende gigtmedicin. Din øvrige smertestillende medicin skal du fortsætte med, også om morgenen på operationsdagen. Smerteplaster skal du også fortsætte med.

Husk!

Selvom du er fastende, må du gerne tage tabletter med vand eller saft indtil to timer før din mødetid. Du må dog ikke spise yoghurt eller indtage andre mælkeprodukter til tabletterne. Hvis du har behov for at bruge mælkeprodukter til din medicin, skal medicinen tages 6 timer før din mødetid.

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket

Aleris Hospitaler ©

16. udgave oktober 2022. Udarbejdet af CTO/VBV/LONI.

Revideres oktober 2025. Godkendt af kvalitetsledelsen

