



Priktest

Undersøgelse for allergi

Formål

En priktest er en vigtig undersøgelse ved mistanke om allergi.

Resultatet af priktesten sammenholdes med din sygehistorie og svar på eventuelle blodprøver, og anvendes til at afgøre, om du er overfølsom over for et eller flere forskellige stoffer.

Forberedelse

De sidste **14 dage** op til priktesten må du ikke anvende øjendråber, der indeholder antihistamin.

Du må ikke smøre dine underarme med creme eller salve, der indeholder binyrebarkhormon.

De sidste **4 dage** inden testen må du ikke tage antihistamin tabletter (allergi- og kløestillende tabletter, fx Clarityn, Semprex, Aerius, Alnok, Zyrtec, Telfast eller lignende).

Hvis du er i behandling med tabletter med binyrebarkhormon (Prednisolon), gælder særlige forholdsregler. Spørg sygeplejersken eller speciallægen, når I aftaler, at du skal have lavet en priktest.

Den **dag** priktesten skal udføres, må du ikke smøre underarmene med fugtighedscreme.

Hvis du er gravid eller ammer, bedes du oplyse sygeplejersken eller lægen om dette.

Selve undersøgelsen

Ved priktesten lægger vi nogle dråber med ekstrakt fra det stof, vi vil undersøge for, på din underarm. Derefter prikker vi med en lille metalspids (lancet) gennem dråberne, så noget af stoffet kommer ind i det øverste lag af huden. Du vil kunne mærke prikket, men de fleste synes ikke, det gør ondt.

Hvis du er allergisk overfor stoffet, vil det vise sig i form af en lille hævelse i huden med kløe og rødme. Reaktionen kommer i løbet af ca. 15 minutter og minder om et myggestik, men det fortager sig normalt i løbet af en times tid. Vi markerer størrelsen af den allergiske reaktion med en pen.

Undersøgelsen varer ca. ½ time.

Svar på undersøgelsen

Du får resultatet af undersøgelsen ved den efterfølgende konsultation hos speciallægen.

Patienttilfredshed

For at vi fortsat kan yde den bedste pleje, behandling og service, beder vi dig venligst udfylde vores tilfredshedsundersøgelse, som du vil modtage på mail, såfremt du har givet tilladelse hertil. Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på at yde det bedst mulige behandlingsforløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet standere, hvor vi spørger dig, om du vil anbefale Aleris til andre. Du afgiver dit svar med blot ét tryk på den smiley du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på Aleris beder vi dig venligst fremsende direkte til Aleriss direktion, att. Den Virksomhedsansvarlige læge, Aleris Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse nærmere om klagemuligheder på Patientombuddets hjemmeside: www.patientombuddet.dk. Her finder du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for fejl, du mener, der er begået, retter du henvendelse til Patientforsikringen. Se vejledning og klageskema på www.patientforsikringen.dk.



Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

Telefon åbningstider i sekretariatet

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket