

41

COSMETIC SURGERY

Udtømning af serom



Efter en operation, hvor større områder af huden har været løsnet, kan der optræde en væskefyldt lomme under huden. En sådan væskefyldt lomme kaldes et serom.

Seromer optræder typisk efter en maveskindsoperation, men kan optræde efter et hvilket som helst kirurgisk indgreb.

Tilstanden opdages typisk ved den første kontrol hos sygeplejersken. Huden er lidt udspilet og man kan evt. fornemme, at væsken flytter sig under huden. Hvis der er meget væske, kan man undertiden føle, at væsken presser under huden. Seromer gør ikke ondt.

Behandling

Sygeplejersken eller lægen udtømmer væsken i ambulatoriet uden bedøvelse med en tilpas tyk nål, som indføres under sterile forhold.

Udtømningen kræver ingen bedøvelse, og man vil kunne køre hjem efter endt behandling.

Efter indgrebet

Nogle gange er én udtømning nok, men ofte må man have flere udtømninger, som hver gang foregår ambulant. Der kan forekomme små lommer, som kan være svære at udtømme, hvorfor udtømningen i sjældne tilfælde foretages ultralydsvejledt, men stadig uden bedøvelse.

Efter udtømningen taler du med sygeplejersken eller speciallægen, som informerer om planen og forholdsregler efterfølgende.

Smerter

Du vil ikke få flere smerter efter en seromu-
dtømning. Ofte føles det som en lettelse, at væsken ikke længere presser under huden.

Forbinding el. bandage

Området som er udtømt skal behandles med en komprimerende bandage (f.eks. mavebælte)

Bad

Du må tage bad som foreskrevet under anbefalinger for det primære indgreb, du har gennemgået

Aktivitet

Så længe der gendanner sig serom, bør du indskrænke dit aktivitetsniveau for ikke at fremprovokere mere væskeansamling.

Arbejde/sygemelding

Gælder som foreskrevet under anbefalinger for det primære indgreb, du har gennemgået.

Mulige bivirkninger og komplikationer

Alvorlige og/eller typiske bivirkninger og komplikationer for dette indgreb

En seromudtømning medfører en lille risiko for infektion svt. indstikstedet.

Hvis der kommer yderligere rødme eller ømhed af huden efter en seromudtømning, vil du blive tilbudt en antibiotikabehandling.

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Odense

J. B. Winsløvs Vej 17B
DK - 5000 Odense
Tlf. +45 3637 2880
odense@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

KQBA00A