

Jern behandling

Direkte i blodbanen ved infusion

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen er at behandle jernmangel og evt. samtidig blodmangel, hvor behandling med tabletter eller mikstur ikke har været tilstrækkelig.

Forberedelse

Vi anbefaler, at du inden behandlingen har læst denne folder.

Behandlingen

- Jernopløsningen er en mørkebrun væske, som blandes op i saltvand
- Du får lagt et lille plastikrør (venflon) i en blodåre på hånden eller på armen, hvor jernopløsningen bliver givet igennem
- Det tager ca. 30. minutter for væsken at løbe ind
- Efterfølgende skal du opholde dig i ventearealet i ca. 30 min i tilfælde af bivirkninger (i særdeleshed anafylaktisk reaktion)

Efter undersøgelsen

Er der gener efter undersøgelsen?

Der kan være en smag af metal samt ømhed hvor droppet (venflon) har været lagt.

Der kan være lidt hovedpine og/eller svimmelhed.

Bivirkninger

Sjældne

- Kvalme
- Opkastninger
- Mavesmerter
- Diarre
- Åndenød
- Hjertebanken
- Hududslæt

Meget sjældne (mindre end 1 %)

- Smagsforstyrrelser
- Feber, lavt blodtryk, brystmerter, rødmen, ødemer (hævelse)
- Føleforstyrrelser, muskel- og ledsmerter
- Anafylaktisk reaktion